

**Stosowanie Plavix, Iscover, Clopidogrel Zentiva, Trombex (klopidogrel) oraz DuoCover, DuoPlavin (klopidogrel + kwas acetylosalicylowy) i występowanie hemofilii nabytej.
(19.08.2013)**

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 31/03/2016 - 22:47

Załącznik:  [Plavix_75mg_300mg_ChPL_28.06.2013.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Plavix_75mg_300mg_ChPL_28.06.2013.pdf) [1]

 [Plavix_Clopidogrel_DHPC_08.2013.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Plavix_Clopidogrel_DHPC_08.2013.pdf) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/stosowanie-plavix-iscover-clopidogrel-zentiva-trombex-klopidogrel-oraz-duocover-duoplavin>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Plavix_75mg_300mg_ChPL_28.06.2013.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Plavix_Clopidogrel_DHPC_08.2013.pdf