

Szczepionki przeciw grypie sezonowej 2012/2013 - informacja URPL,WM i PB

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 15/01/2016 - 10:44

Szczepionki przeciw grypie sezonowej dopuszczone do obrotu na terenie Polski posiadają taki sam skład jakościowy jak te, dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej co więcej posiadają one taki sam skład, jak dla całej półkuli północnej Ziemi. Szczepionki te są szczepionkami trójwalentnymi, to znaczy, że zawierają one trzy szczepy (substancje czynne) wirusa grypy, uodparniające przeciw tym konkretnym szczepom.

W każdej szczepionce przeciw grypie sezonowej występują trzy szczepy wirusa grypy:

- szczep wirusa grypy A (H1N1),
- szczep wirusa grypy A (H3N2),
- szczep wirusa grypy B.

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) publikuje zalecenia dotyczące składu szczepionek przeciw grypie sezonowej dla każdej z półkul. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia wytyczne dla krajów Wspólnoty przedstawia Europejska Agencja Leków (EMA).

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia względem szczepów są wynikiem analizy sytuacji epidemiologicznej w danym sezonie. Wartym zauważenia jest fakt, że wirus grypy typu A (H1N1) czyli A/California/7/2009(H1N1)pdm09, jest wirusem odpowiedzialnym za wywołanie pandemii w 2009 r. (potocznie nazywanym wirusem świńskiej grypy).

Na terenie Polski dopuszczonymi do obrotu i dostępnymi na rynku są szczepionki inaktywowane, zarówno posiadające rozszczepiony wirion, jak i antygeny powierzchniowe wirusa grypy.

Wskazaniem do stosowania szczepionek przeciw grypie sezonowej jest: profilaktyka grypy, szczególnie u osób narażonych na powikłania pogrypowe. Szczepionki p/grypie wskazane są do stosowania zarówno dla dorosłych i dzieci (od ukończenia 6. miesiąca życia). Ponadto stosowanie szczepionki powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami narodowymi określonymi w programie szczepień ochronnych^[1] [1].

Dostępne na rynku polskim szczepionki są szczepionkami jednodawkowymi w ampułko-strzykawkach o pojemności 0,5 ml (dawka dla dorosłych) oraz o pojemności 0,25 ml (dawka dla dzieci). Osoby dorosłe oraz dzieci od 36. miesiąca życia i starsze otrzymują 0,5 ml. Natomiast dzieciom od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia można podawać dawki 0,25 ml lub 0,5 ml. Stosowana dawka powinna być zgodna z istniejącymi krajowymi zaleceniami. Dzieciom, które uprzednio nie były szczepione, należy podać drugą dawkę po co najmniej 4 tygodniach.

Szczepionki przeciw grypie sezonowej 2012/2013 - informacja URPL,WM i PB

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Możliwe są dwie drogi podania - szczepionkę podaje się domięśniowo lub głęboko podskórnio.

[1] [2]Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013 [http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2012/78/akt.pdf] [3]]

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/szczepionki-przeciw-grypie-sezonowej-20122013-%E2%80%93-informacja-urplwm-i-pb>

Odnosińki

[1] http://urpl.gov.pl/aktualnosci/szczepionki-przeciw-grypie-sezonowej-2012-2013-informacja-urplwm-i-pb-1#_ftn1

[2] http://urpl.gov.pl/aktualnosci/szczepionki-przeciw-grypie-sezonowej-2012-2013-informacja-urplwm-i-pb-1#_ftnref1

[3] http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2012/78/akt.pdf