

Nie zaleca się stosowania apiksabanu (Eliquis), eteksylanu dabigatranu (Pradaxa), edoksabanu (Lixiana/Roteas)

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Nie zaleca się stosowania apiksabanu (Eliquis), eteksylanu dabigatranu (Pradaxa), edoksabanu (Lixiana/Roteas), rywaroksabanu (Xarelto) u pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym (APS) z powodu możliwego zwiększonego ryzyka nawrotów zdarzeń zakrzepowych

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 20/05/2019 - 15:51

Załącznik:  [DHPC_17.2019_DOAC.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/nie-zaleca-si%C4%99-stosowania-apiksabanu-eliquis-eteksylanu-dabigatranu-pradaxa-edoksabanu-lixianaroteas>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DHPC_17.2019_DOAC.pdf